

# ALERTA MÉDICA

Tengo la **ENFERMEDAD DE PARKINSON** que puede hacer que me mueva lentamente y tenga dificultad para ponerme de pie o hablar

**NO ESTOY INTOXICADO(A).**

Por favor, llame a mi familia o médico para obtener ayuda.



1-800-4PD-INFO (473-4636)  
opción 3 para español  
[www.parkinson.org](http://www.parkinson.org)

# MEDICAL ALERT

I have **PARKINSON'S DISEASE** which could make me move slowly and have difficulty standing or speaking.

**I AM NOT INTOXICATED.**

Please call my family or physician for help.



1-800-4PD-INFO (473-4636)  
[www.parkinson.org](http://www.parkinson.org)

MI NOMBRE

---

DOMICILIO

---

CONTACTO DE EMERGENCIA

TELÉFONO

---

MÉDICO

TELÉFONO

---

ALERGIAS/OTRAS CONDICIONES MÉDICAS

---

MY NAME

---

HOME ADDRESS

---

EMERGENCY CONTACT

PHONE

---

PHYSICIAN

PHONE

---

ALLERGIES/OTHER MEDICAL CONDITIONS

---

## Información importante que comunicar en caso de emergencia

- Tengo la enfermedad de Parkinson.
- Necesito mis medicamentos a tiempo, siempre. De lo contrario, mis síntomas de Parkinson podrían volverse graves e incontrolables.
- Cualquier cambio en la medicación para la EP debe ser consultado con mi médico.
- Muchos medicamentos comunes para el dolor, las náuseas, la depresión, el sueño y la psicosis no son seguros para las personas con la EP. Si requiero algún antipsicótico, usar pimavanserin (Nuplazid), quetiapina (Seroquel) o clozapina (Clozaril).

Dé la vuelta a esta tarjeta para ver la lista de medicamentos contraindicados.

## Important Information to Communicate in an Emergency

- I have Parkinson's disease.
- I need my medications on time, every time. Otherwise, my Parkinson's symptoms may become severe and uncontrollable.
- Any Parkinson's medication changes need to be discussed with my doctor.
- Many common medications for pain, nausea, depression, sleep and psychosis are not safe for people with PD. If an antipsychotic is necessary, use pimavanserin (Nuplazid), quetiapine (Seroquel) or clozapine (Clozaril).

Please turn over this card for a list of contraindicated medications.

## Safe & Contraindicated Medications in Parkinson's Disease

Safe Medications	Medications to Avoid
<b>Antipsychotics</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimavanserin (Nuplazid)</li> <li>• Quetiapine (Seroquel)</li> <li>• Clozapine (Clozaril)</li> </ul>	Haloperidol (Haldol) and other typical antipsychotics. Atypical antipsychotics other than those identified in the safe column.

Anesthesia & Pain Medication	
Consult with the patient's PD doctor or hospital neurologist, anesthesiologist and surgeon to determine the best treatment plan whenever possible.	Beware of mixing MAO-B inhibitors with the following pain medications: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meperidine (Demerol)</li> <li>• Tramadol (Rybitx, Ryzolt, Ultram)</li> <li>• Droperidol (Inapsine)</li> <li>• Methadone (Dolophine, Methadose)</li> <li>• Propoxyphene (Darvon, PP-Cap)</li> <li>• Cyclobenzaprine (Amrix, Fexmid, Flexeril)</li> </ul>
Local or regional anesthesia generally have fewer side effects than general anesthesia for people with PD and should be used as an alternative when appropriate.	

Gastrointestinal (GI) & Nausea Medications	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidone (Motilium)</li> <li>• Ondansetron (Zofran)</li> <li>• Dolasetron (Anzemet)</li> <li>• Granisetron (Kytril)</li> <li>• Aprepitant (Emend)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prochlorperazine (Compazine)</li> <li>• Metoclopramide (Reglan)</li> <li>• Promethazine (Phenergan)</li> <li>• Droperidol (Inapsine)</li> </ul>

**Caution:** Benzodiazepines, muscle relaxants, bladder control medications and other medications used for sleep and pain may lead to confusion, hallucinations, falls and other symptoms. Also, though most antidepressants are safe to use, amoxapine (Asendin) may lead to worsening movement symptoms for people with PD.

If a patient has a deep brain stimulation (DBS) device there are requirements for MRI scans, EKGs and EEGs.	If a patient has an existing Duopa device, clinicians should: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the device off, disconnect it and remove it from the room during imaging.</li> </ul> Go to Duopa.com or call 1-844-386-4968 to speak with registered nurses about the pump, tubing or medication cassettes.
Contact the device manufacturer or the patient's Parkinson's doctor for more information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbott: 1-800-727-7846</li> <li>• Boston Scientific: 1-833-327-4636</li> <li>• Medtronic: 800-510-6735</li> </ul>	

## Medicamentos seguros y contraindicados en la enfermedad de Parkinson

Medicamentos seguros	Medicamentos a evitar
<b>Antipsicóticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimavanserin (Nuplazid)</li> <li>• Quetiapina (Seroquel)</li> <li>• Clozapina (Clozaril)</li> </ul>	Haloperidol (Haldol) y otros antipsicóticos típicos. Antipsicóticos atípicos distintos de los seguros.

Anestesia y analgésicos	
Consulte con el médico especialista en la EP del paciente o con el neurólogo, el anestesiólogo y el cirujano del hospital para determinar el mejor plan de tratamiento siempre que sea posible.	Cuidado con mezclar inhibidores de la MAO-B con los siguientes analgésicos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meperidina (Demerol)</li> <li>• Tramadol (Rybitx, Ryzolt, Ultram)</li> <li>• Droperidol (Inapsine)</li> <li>• Metadona (Dolofina, Metadosa)</li> <li>• Propoxifeno (Darvon, PP Cap)</li> <li>• Ciclobenzaprina (Amrix, Fexmid, Flexeril)</li> </ul>
La anestesia local o regional suele tener menos efectos secundarios que la anestesia general para las personas con la EP y debe utilizarse como alternativa cuando sea apropiado.	

Medicamentos para síntomas gastrointestinales (GI) y las náuseas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domperidona (Motilium)</li> <li>• Ondansetrón (Zofran)</li> <li>• Dolasetrón (Anzemet)</li> <li>• Granisetrón (Kytril)</li> <li>• Aprepitant (Emend)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proclorperazina (Compazine)</li> <li>• Metoclopramida (Reglan)</li> <li>• Prometazina (Phenergan)</li> <li>• Droperidol (Inapsine)</li> </ul>

**Precaución:** Las benzodiazepinas, los relajantes musculares, los medicamentos para el control de la vejiga y otros medicamentos usados para el sueño y el dolor pueden provocar confusión, alucinaciones y otros síntomas. Además, aunque la mayoría de los antidepresivos son de uso seguro, la amoxapina (Asendin) puede empeorar los síntomas motores en las personas con la EP.

Si un paciente tiene un dispositivo de estimulación cerebral profunda (ECP), hay requisitos para realizarle resonancias magnéticas, electrocardiogramas y electroencefalogramas.	Si el paciente tiene un dispositivo Duopa implantado, los médicos deberán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apagar el dispositivo, desconectarlo y sacarlo del cuarto durante la toma de imágenes.</li> </ul> Visite Duopa.com o llame al 1-844-386-4968 para hablar con enfermeras calificadas acerca de la bomba, los tubos o los casetes de medicación.
Póngase en contacto con el fabricante del dispositivo o con el médico de la EP del paciente para obtener más información: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbott: 1-800-727-7846</li> <li>• Boston Scientific: 1-833-327-4636</li> <li>• Medtronic: 800-510-6735</li> </ul>	