

Medicamentos para síntomas motores



No hay un tratamiento estándar para la enfermedad de Parkinson (EP). El tratamiento de cada persona con Parkinson se basa en sus síntomas. Hay muchos medicamentos disponibles para tratar los síntomas motores del Parkinson y es común que las personas con EP tomen una variedad de estos medicamentos (en distintas dosis y momentos del día) para manejar los síntomas motores.

Recuerde que la medicación es sólo una parte del plan de tratamiento general para combatir la EP. El ejercicio, la terapia física y ocupacional, así como los cambios en el estilo de vida, también son clave para vivir bien con Parkinson.

Importante: Estas tablas de medicamentos están diseñadas como insertos complementarios para ser utilizados con el libro *Medications: A Treatment Guide to Parkinson's*. Los medicamentos que se enumeran a continuación son sólo medicamentos que requieren receta médica y no incluyen medicamentos de venta libre. Si bien esta es una amplia lista de medicamentos para síntomas no motores, no es exhaustiva.

Levodopa

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Tabletas de liberación inmediata de carbidopa/levodopa (Sinemet)	Tabletas de 10/100, 25/100 o 25/250 mg	150–2,000 mg de levodopa/día en dosis separadas	Presión arterial baja, mareos, náuseas, estreñimiento y cambios de comportamiento	Para los síntomas del Parkinson (lentitud, rigidez, temblor, etc.)
Carbidopa/levodopa liberación inmediata de desintegración oral (Parcopa)	Tabletas de 10/100, 25/100 o 25/250 mg	150–2,000 mg de levodopa/día en dosis separadas	Igual que arriba	Igual que arriba (Puede ser apropiado para personas con dificultad para tragar)
Tabletas de liberación controlada de carbidopa/levodopa (Anteriormente, Sinemet CR)	Tabletas de 25/100 o 50/200 mg	200–2,400 mg de levodopa/día en dosis separadas	Igual que arriba	Para los síntomas del Parkinson (lentitud, rigidez, temblor, etc.)
Tabletas de liberación prolongada de carbidopa/levodopa (Rytary)	Cápsulas de 23.75/95, 36.25/145, 48.75/195 o 61.25/245 mg	855–2,340 mg de levodopa/día	Igual que arriba	Igual que arriba

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Tabletas de carbidopa/levodopa/entacapona (Stalevo) [Ver: entacapona en sección de inhibidores de la COMT]	Tabletas de 12.5/50/200, 18.75/75/200, 25/100/200, 31.25/125/200, 37.5/150/200 o 50/200/200 mg	150–1,200 mg de levodopa/día	Igual que el anterior, más diarrea y orina descolorida (debido a la entacapona)	Reemplazo de carbidopa/levodopa de liberación inmediata para fluctuaciones de estado "on/off"
Suspensión enteral de Carbidopa/levodopa (Duopa) por medio de tubo implantado quirúrgicamente en intestino delgado	4.86/20 por ml	Hasta 2,000 mg de levodopa durante 16 horas diurnas	Presión arterial baja, mareos, náuseas y estreñimiento	Para el tratamiento de las fluctuaciones "on/off" en el Parkinson avanzado
Polvo inhalado de levodopa (Inbrija)	42 mg por cápsula	84 mg (2 cápsulas) inhalados por la boca hasta 5 veces/día según se necesite	Igual que el anterior, más tos	Para episodios intermitentes y repentinos de "off" en combinación con carbidopa/levodopa

Agonistas de la Dopamina

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Ropinirol (anteriormente, Requip)	Tabletas de 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4 o 5 mg	9–24 mg/día en 3 dosis separadas	Presión arterial baja, mareos, náuseas, hinchazón de las piernas, confusión, ataques de sueño y cambios de comportamiento, incluidos los comportamientos compulsivos	Para los síntomas del Parkinson (lentitud, rigidez, temblor, etc.) y el síndrome de piernas inquietas (SPI)
Ropinirol de liberación prolongada (anteriormente Requip XL)	Tabletas de 2, 4, 6, 8 o 12 mg	8–24 mg una vez al día	Igual que arriba	Igual que arriba
Pramipexol (Mirapex)	Tabletas de 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1 o 1.5 mg	1.5–4.5 mg/día en 3 dosis separadas	Igual que arriba	Igual que arriba
Pramipexol liberación prolongada (Mirapex ER)	Tabletas de 0.375, 0.75, 1.5, 2.25, 3, 3.75 o 4.5 mg	1.5–4.5 mg una vez al día	Igual que arriba	Igual que arriba



Agonistas de la Dopamina

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Rotigotina (Neupro)	Parche de 1, 2, 3, 4, 6 u 8 mg	4–8 mg una vez al día	Presión arterial baja, mareos, náuseas, hinchazón de las piernas, confusión, ataques de sueño y cambios de comportamiento, incluidos los comportamientos compulsivos y posible irritación de la piel	Para los síntomas del Parkinson (lentitud, rigidez, temblor, etc.) y el síndrome de piernas inquietas (SPI)
Apomorfina, inyecciones subcutáneas (Apokyn)	Ampolleta de 10 mg/ml	Por lo general, 0.2–0.6 ml cada 2 horas, según sea necesario	Igual que el anterior, más posible irritación en el sitio de la inyección	Para episodios "off" repentinos e intermitentes
Película sublingual de apomorfina (Kynmobi)	Película sublingual de 10, 15, 20, 25, 30 mg	Una película de 10 mg colocada debajo de la lengua según sea necesario, hasta 5 veces/día según sea necesario	Igual que el anterior, más posible irritación de la boca/garganta	Igual que arriba

Inhibidores de la MAO-B

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Selegilina (anteriormente, Eldepryl)	Comprimidos o cápsulas de 5 mg	5 mg dos veces/día (con el desayuno y el almuerzo)	Nausea, boca seca, mareo, estreñimiento; puede empeorar la discinesia	Se puede usar solo o con carbidopa/levodopa para los síntomas del Parkinson (lentitud, rigidez, temblor, etc.)
Rasagilina (Azilect)	Tabletas de 0.5 o 1.0 mg	1 mg una vez al día	Igual que arriba	Igual que arriba
Selegilina HCL tableta de desintegración oral (Zelapar)	Tabletas de 1.25 o 2.5 mg	1.25–2.5 mg una vez al día	Igual que arriba	Igual que arriba
Safinamida (Xadago)	Tabletas de 50 o 100 mg	50–100 mg una vez al día	Igual que arriba	Puede usarse con carbidopa/levodopa para fluctuaciones de estado "on/off"



Inhibidores de la COMT

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Entacapona (Comtan)	Tabletas de 200 mg	Comprimidos de 200 mg con cada dosis de levodopa	Aumento de los efectos secundarios de la levodopa (discinesia, presión arterial baja/mareos), diarrea, orina descolorida	Usado con carbidopa/levodopa para fluctuaciones de estado "on/off"
Opicapona (Ongentys)	Cápsulas de 25 o 50 mg	50 mg una vez al día antes de dormir	Aumento de los efectos secundarios de la levodopa	Igual que arriba
Tolcapona (Tasmar)	Tabletas de 100 mg	100 mg Hasta 3 veces/día Hasta 3 veces/día	Aumento de los efectos secundarios de la levodopa, más diarrea, orina descolorida y puede causar problemas hepáticos	Igual que arriba

Antagonistas de Adenosina A2A

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Istradefilina (Nourianz)	Tabletas de 20 o 40 mg	20-40 mg una vez al día	Discinesia, insomnio, alucinaciones y mareos	Usado con carbidopa/levodopa para fluctuaciones de estado "on/off"

Amantadina

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Amantadina (anteriormente, Symmetrel)	Cápsulas o tabletas de 100 mg	100 mg 2-3 veces/día	Mareos, alucinaciones, náuseas, confusión, decoloración de las piernas, presión arterial baja al estar de pie, boca seca, estreñimiento, retención urinaria	Para la discinesia inducida por levodopa y otros síntomas del Parkinson
Amantadina ER cápsulas (Gocovri)	Cápsulas de 68.5 o 137 mg	137-274 mg una vez al día antes de dormir	Igual que arriba	Igual que arriba



Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Amantadina ER tabletas (Osmolex ER)	Tabletas de 29, 193 o 258 mg	129–322 mg una vez al día al despertar	Náuseas, mareos/ aturdimiento e insomnio	Para la discinesia inducida por levodopa y otros síntomas del Parkinson

Anticolinérgicos

Medicamentos (nombre comercial entre paréntesis)	Dosis	Tratamiento típico	Efectos secundarios comunes	Uso en el Parkinson
Trihexifenidilo (anteriormente Artane)	Comprimidos de 2 o 5 mg Elixir de 2mg/5mL	1–2 mg 2-3 veces/día	Confusión, problemas de memoria, alucinaciones, boca seca, visión borrosa, retención urinaria	Para temblores y distonía en personas con Parkinson de inicio temprano; evitar en adultos mayores
Benzotropina (Cogentin)	Tabletas de 0.5 1 o 2 mg	0.5–2 mg 2-3 veces/día	Igual que arriba	Igual que arriba

También está disponible una amplia gama de publicaciones gratuitas, incluyendo nuestro libro, Medications. Para pedir las, llame o envíe un correo a nuestra Línea de Ayuda: 1.800.4PD.INFO (1.800.473.4636) opción 3 para español/Helpline@Parkinson.org. ¿No está listo para hablar con alguien acerca del Parkinson? Visite Parkinson.org para obtener información confiable.

La impresión fue posible gracias a una subvención de Kyowa Kirin.